



RECHERCHE de la Vipère péliade (*Vipera berus*)

Prospection à vue

Où la rechercher ?



Le long des lisières forestières, les bords de ronciers et de fourrés d'ajoncs, les ourlets herbacés dans les pelouses calcicoles, les ourlets herbacés en bord de haies, les landes, les bords de voies ferrées, les secteurs embroussaillés et à végétation herbacée dense.

Comment ?

● Concentrez-vous :

Mimétique et souvent dissimulée dans la végétation ou autres refuges, on n'aperçoit bien souvent que quelques centimètres de son corps. Il faut donc la chercher activement en scrutant attentivement les zones favorables. Il est important de ne pas se laisser divertir par l'observation d'autres espèces comme les oiseaux, les insectes, etc. En effet, un individu peut vous avoir repéré et fuir en quelques secondes sans que vous le sachiez.

- **Adoptez une approche calme :**


La Vipère péliade est dotée d'une bonne vue et elle est sensible aux vibrations transmises par le sol. Il convient donc de se déplacer discrètement.

- **Évitez le plus possible de projeter votre propre ombre où vous cherchez :**

Il est préférable de se déplacer de façon à ne pas projeter d'ombre sur les animaux qui peut provoquer leur fuite.

- **Regardez quelques mètres devant vous :**

Balayez du regard le secteur sur quelques mètres. L'utilisation de jumelles à mise au point rapprochée peut être utile pour confirmer la présence d'une vipère à quelques mètres devant soi ou sur des zones difficilement accessibles.



CHANGEZ SOUVENT DE PERSPECTIVE :
S'arrêter régulièrement et regarder autour de soi permet de découvrir des individus.

- **Restez à l'écoute :**

Si vous avez entendu un léger bruissement dans la végétation et que vous avez un doute, il peut être intéressant de repasser à cet endroit dix à vingt minutes plus tard. L'animal sera peut-être revenu s'exposer là où il avait été dérangé. Cette technique est très efficace dans de nombreux cas et elle est bien plus productive que d'essayer de poursuivre une vipère se faufilant dans la broussaille.

- **Ne vous découragez pas !**


La Vipère péliade est rarement observée dès la première visite, il faut souvent faire de nombreuses prospections pour obtenir la preuve de sa présence. Il faudrait au minimum huit sorties aux bonnes dates et dans de bonnes conditions pour prouver son absence d'un site.

Quand la rechercher ?

L'espèce est visible entre le 1er mars et la mi-octobre selon les conditions météorologiques.

Les périodes où l'espèce est plus facilement détectable sont : entre début mars et la mi-mai puis de la fin août à la mi-octobre.

Selon les conditions météorologiques, les prospections matinales sont plus favorables à l'observation de l'espèce.



Quelles conditions météorologiques ?

La journée «idéale» est une journée avec une température maximale comprise entre 15-20°C, pas de vent ou très peu, une couverture nuageuse de 50% laissant passer les rayons du soleil.

Il faut éviter les journées venteuses, les journées chaudes, les journées à ciel complètement dégagé. Privilégiez les journées moyennement nuageuses (mitigé).

Voici quelques indications de températures favorables pour la prospection selon les grands types d'ensoleillement :

- temps ensoleillé : 6°C à 13°C ;
- temps mitigé : 14°C à 18°C ;
- temps couvert à faiblement pluvieux : 19°C à 22°C



Retrouvez les autres fiches techniques sur : www.cen-hautsdefrance.org

Initié par :



Grâce au soutien de :



Rédaction : © CEN - G.Rey - Photos : © CEN - T.Cheyrezy, G.Rey - Conception graphique : © CEN - C.Lelong