

Les boisements alluviaux



Les boisements alluviaux sont des habitats caractérisés par leur inondabilité, souvent riverains d'un cours d'eau. Lors d'épisodes de crues, le ru peut sortir de son lit et submerger les berges de l'île. Une végétation spécifique s'est ainsi développée avec plusieurs espèces de la flore caractéristique.

Le Lorient d'Europe




De la taille d'un merle, le mâle a un plumage très reconnaissable. En effet, ses ailes et sa queue sont noires et le reste de son corps est jaune d'or. Oiseau très discret, protégé par la loi, on le reconnaît grâce à son chant clair et flûté. Il passe l'hiver sur le continent africain et revient pour la saison de reproduction vers la mi-avril.

La Moschatelline



Cette plante tient son nom de son odeur musquée très caractéristique. Elle est assez commune dans les sous-bois frais de la région et peut passer inaperçue avec ses couleurs claires. Son inflorescence est de forme cubique formée de 5 fleurs verdâtres. Partez à sa découverte du mois d'avril à juin.



Le Calopteryx vierge

Le Calopteryx vierge est une demoiselle. Le mâle a

les ailes brun noir foncé veinées de bleu lorsque celles de la femelle sont marron clair. Il apprécie les zones humides, bords de cours d'eau. Sensible à tout type de pollution, sa présence un très bon indicateur de la qualité du cours d'eau. A observer de mai à août.

Libellule ou demoiselle ?



De la famille des odonates, les libellules et demoiselles sont des cousines, aux nombreux points communs : terrestres à l'état adulte et aquatiques à l'état larvaire, deux paires d'ailes transparentes, un corps allongé... Comment les distinguer ? C'est simple ! Lorsqu'elle se pose la libellule (Anisoptère) garde les ailes largement étendues sur les côtés. En revanche, la demoiselle (Zygoptère) replie ses ailes le long de « son dos ».

L'Ornithogale des Pyrénées



De la famille des lys, elle est aussi appelée Asperge des bois. D'ailleurs, les jeunes pousses, observables dès le mois de mai, peuvent être consommées. L'espèce fleurira un mois plus tard. Assez rare dans la région, elle est surtout présente dans le sud de l'Aisne.